

Vida&futuro

CONTACTENOS - editorvida@comercio.com.pe

CAMPAÑA CONTRA CONSUMO DEL ALCOHOL

El Ministerio de Sanidad británico advierte a las mujeres que una copa diaria de vino incrementaría en un 50% las probabilidades de desarrollar tumores de mama.

FLICKR AHORA ALOJA VIDEOS

Flickr, propiedad de Yahoo, inauguró ayer un nuevo servicio de videos en línea. Este solo está activo para los usuarios de pago.



OJO: Los hombres de mediana edad que comen siete o más huevos por semana correrían riesgo de muerte, advirtió el "American Journal of Clinical Nutrition". No se reveló qué componente elevaría el peligro.

AVANCE CONTRA UN MAL PELIGROSO EN EL PERÚ

Con el ADN detectarán el virus de papiloma

■ Nueva tecnología permite descubrir cualquiera de los cien tipos de VPH

■ Prueba tradicional del Papanicolaou muestra solo casos precancerosos

Los adelantos en investigación y tecnología médica siguen llegando a nuestro país. Uno de ellos es la prueba para detectar cantidades mínimas del virus de papiloma humano (VPH), por medio del análisis de ADN (ácido desoxirribonucleico).

Como se sabe, hoy en día la prueba más común para detectar el VPH es el Papanicolaou. Este examen, afirma la doctora Isabel Montoya, directora científica de laboratorios Biolinks, solo ayuda a detectar el virus cuando existe una lesión precancerosa, e identifica esta enfermedad hasta el 70% de los casos.

Sin embargo, con este moderno análisis de ADN que realiza el referido laboratorio es posible determinar con precisión el tipo de VPH que padece una persona. Según estudios científicos, existen más de 100 tipos de VPH, de los cuales alrededor de 60 se pueden transmitir a través del contacto sexual.

"Pero es necesario aclarar que no todos tienen relación con el cáncer. Los VPH que tienen altas probabilidades de conducir a un cáncer cervical se conocen como virus oncogénicos y están formados por los tipos 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68 y 69.



GIANCARLO SHIBAYAMA

DETECCIÓN. En los laboratorios Biolinks se analiza el ADN para detectar el papiloma mediante biología molecular.

EN PUNTOS

1 Estudios científicos reconocen que el virus de papiloma humano (VPH) es el principal factor de riesgo para el desarrollo del cáncer de cuello uterino. El virus tiene un rol importante en la aparición del cáncer al ano, pene, vulva y vagina.

2 En el Perú su incidencia es de 39 casos por cada 100.000 mujeres. De ellos, el 60% se presenta entre los 35 a 55 años y el 20% cuando se pasa de los 65 años.

3 Más información sobre el análisis a través del ADN en: www.biolinksperu.com

Entre los VPH no oncogénicos están los tipos 6, 11, 42, 43 y 44", añadió la especialista.

Gracias a la última tecnología médica se ha logrado una vacuna contra el virus de papiloma humano, que si bien no cura la enfermedad, sí protege al organismo contra las variantes del VPH-16 y VPH-18.

En el Perú la vacuna se aplica en clínicas y centros privados. El precio por dosis es de 180 dólares y son necesarias tres de ellas en un lapso de seis meses. Los médicos recomiendan aplicar la primera dosis antes del inicio de la actividad sexual.

Recientes investigaciones aseguran que los virus tipo VPH-16 y VPH-18 son los que se transmiten por vía sexual y están relacionados con el cáncer.

DETECCIÓN PRECISA

Tras explicar que a través de los laboratorios Biolinks se realizan los análisis de ADN que detectan con precisión cuál de los tipos de virus viene atacando a la persona infectada, subrayó que en el caso de este tipo de infección (papilomas) lo recomendable es la prevención.

"Es en este sentido que las pruebas a través del ADN permiten detectar en forma temprana la presencia del virus, identificando el tipo de VPH", afirmó.

El procedimiento para el análisis es similar al del Papanicolaou. Se extrae del cuello uterino las muestras que luego serán analizadas en el laboratorio, usando técnicas de biología molecular.

ELABORAN LISTA DE PELIGROS PARA LAS MUJERES

Cuidado con tratamiento de los estrógenos

■ Estudio revela que duplica el riesgo de tumores en el seno durante la menopausia

WASHINGTON [AFP]. Un tratamiento hormonal compuesto solo con estrógenos duplica el riesgo de tumores no cancerígenos en el seno de mujeres en la menopausia, comparativamente a aquellas tratadas con un placebo, según trabajos publicados desde este martes en la versión en línea del "Journal of the National Cancer Institute".

Este estudio reexamina los datos provenientes de una investigación realizada como parte de la Women's Health Initiative, que enumeró un conjunto de riesgos para las mujeres que se someten a un tratamiento de hormonas a largo plazo.

También se estableció que un tratamiento que combina estró-

genos y progestina, forma sintética de la progesterona (otra hormona femenina), aumenta el riesgo de cáncer de seno. Aunque este no es el caso para los tratamientos en los que intervienen solo estrógenos, según este nuevo estudio.

Para este informe, 10.739 mujeres en la menopausia que fueron sometidas a una histerectomía, procedimiento en el que se extirpa el útero, fueron tratadas con estrógenos o con un placebo.

Fueron controladas durante siete años y ninguna mostró un aumento del riesgo de desarrollar cáncer de seno.

No obstante, el equipo de investigadores liderado por el doctor Tom Rohan, de la Facultad de Medicina de la Universidad Albert Einstein en Nueva York, analizó los resultados de biopsias realizadas a este grupo y estos revelaron 232 casos de proliferación del tejido en el seno. ■

IR POR LANA Y SALIR TRASQUILADO

Hombres confunden gestos y el interés sexual

■ Investigación detecta que los varones tienen peor interpretación del lenguaje no verbal

MADRID. ¿Amistad o sexo? Para muchos hombres no es fácil saber si una mujer está buscando con ellos una cosa o la otra. Y esta confusión no se debe a la creencia popular de que ellos piensan más en el sexo que las chicas. Una nueva investigación descubre la causa del malentendido: los varones tienen peor ojo para interpretar el lenguaje no verbal,

según lo revela la edición digital de "El Mundo".

"Las mujeres pueden sonreír, aguantar la mirada, aproximarse físicamente o tocar a su interlocutor cuando están interesadas sexualmente en él. El problema es que los mismos recursos pueden emplearse para demostrar simplemente amistad o un interés platónico, sin ninguna intención de llegar más lejos. Y esta ambigüedad desorienta a los hombres más que a las mujeres", escriben los autores del estudio publicado en "Psychological Science". ■

www.volkswagen.com.pe



Dirán que te ascendieron, que te ves más joven, que sentaste cabeza, y todas esas cosas que la gente dice cuando a alguien le va bien.

JETTA. Te va bien. (Ahora con 170hp)

